

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用 時期	本剤の 使用回数	テブコナゾール を含む農薬の 総使用回数	使用 方法	
りんご	モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 赤星病	2000	200 ~700	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	散布	
	黒星病	2000~4000						
おうとう	黒斑病 褐色せん孔病	2000		収穫前日まで				
	灰星病 炭疽病							
もも ネクタリン	ホモプシス腐敗病 黒星病 うどんこ病			2000~3000				収穫前日まで
	炭疽病 うどんこ病 落葉病							
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病	2000		収穫21日前まで				
	灰色かび病	3000						
かき(葉)	炭疽病 うどんこ病 落葉病	2000		収穫前日まで				
なし	輪紋病 黒斑病 うどんこ病	2000~4000						
	小粒核果類 (うめを除く)	黒星病 灰星病	2000	収穫前日まで				
黒星病 すす斑病 灰星病								
うめ	黒星病 すす斑病 灰星病	2000	5~10/株	生育期ただし、 収穫前日まで	2回以内	2回以内	散布	
ぶどう	晩腐病 黒とう病 さび病 灰色かび病 うどんこ病 すす点病 褐斑病 白腐病							
	いちじく	株枯病	100 ~300	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	散布	
ねぎ わけぎ あさつき	さび病 黒斑病	4000	収穫前日まで					
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病	1000	100 ~300	収穫21日前まで	3回以内	3回以内	散布	
しそ	さび病			収穫前日まで				
にんにく	さび病	1000	100 ~300	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	散布	
	葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病			収穫前日まで				
キャベツ	菌核病	1000~2000	100 ~300	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	散布	
にら	さび病			収穫前日まで				
にら(花茎)				収穫前日まで				
しょうが	白星病	2000	200 ~400	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	
		32						3.2
		50						3.2~6.5
		100						5~13
未成熟そらまめ	さび病	4000	100 ~300	収穫前日まで	2回以内	2回以内	散布	
やまのいも やまのいも(むかご)	炭疽病 葉渋病	1000		収穫7日前まで				
茶	炭疽病 もち病 褐色円星病	2000~3000	200 ~400	摘採7日前まで	3回以内	3回以内	散布	
	新梢枯死症 網もち病	2000						
ホップ	うどんこ病	1000	200~700	収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
ゆり	乾腐病	50	—	植付前又は 貯蔵前	1回	1回	1分間 球根浸漬	
チューリップ	球根腐敗病			植付前			15分間 球根浸漬	
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	2000	200~300	発病初期	5回以内	5回以内	散布	