

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	使用回数*	使用方法	
ぶどう	晩腐病 褐斑病 さび病 べと病 黒とう病	1000	200~700	収穫45日前まで	2回以内	散布	
りんご	斑点落葉病 赤星病 黒星病 黒点病 モニリア病 すす点病 すす斑病	500~600		収穫30日前まで	3回以内		
	輪紋病	500					
	褐斑病 炭疽病	600					
びわ	たてぼや病	600		落弁期まで	2回以内		
マンゴー	炭疽病	800		収穫45日前まで			
あけび(果実)	そうか病 斑点細菌病	500		収穫60日前まで			
なし	赤星病 黒星病 黒斑病 輪紋病	400~600		収穫30日前まで	5回以内		
もも	黒星病 果実赤点病 すすかび病	600		収穫21日前まで	3回以内		
おうとう	灰星病 炭疽病				2回以内		
かき	炭疽病 落葉病 黒星病	400~800	収穫45日前まで	2回以内			
	黒点病	400					
みかん	黄斑病 小黒点病	600~800	200~700	収穫30日前まで	4回以内		
	ミカンサビダニ	1000					
	そうか病	400					
	褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病(さび果) チャノキイロアザミウマ	400~600					
	黒点病	400~800				5	4
		10				8	
20		16					
かんきつ (みかんを除く)	黒点病 黄斑病 小黒点病	600~800	200~700	収穫90日前まで	4回以内		
	ミカンサビダニ	1000					
	褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病(さび果) 汚れ果症 幹腐病 チャノキイロアザミウマ	600					
	黒点病	5				4	
		10				8	
20		16					
くり	実炭疽病	600	200~700	収穫7日前まで	2回以内		
すいか	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 褐斑細菌病	400~600	200~700	収穫7日前まで	7回以内		
メロン	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 斑点細菌病				5回以内		
かぼちゃ	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病	600	200~700	収穫21日前まで	2回以内		
はくさい	べと病 白斑病 黒斑病				1回		
キャベツ	べと病	400~600	100~300	収穫3日前まで	3回以内		
たまねぎ	べと病 さび病 黒斑病 灰色腐敗病 灰色かび病				5回以内		
	白色疫病				400~500		
ねぎ	べと病 さび病 黒斑病	600	収穫14日前まで	3回以内			
トマト	疫病 葉かび病 輪紋病	800	200~700	収穫前日まで	2回以内		
きゅうり	炭疽病 疫病 黒星病 つる枯病 褐斑病 斑点細菌病	600			3回以内		
		べと病	600~800				
にんじん	黒葉枯病	400~600	収穫7日前まで	3回以内			
アスパラガス (露地栽培)	斑点病	500	200~700	収穫終了後 但し、秋期まで	6回以内		
	茎枯病 褐斑病	400~600					
ばれいしょ	夏疫病	100	25	収穫7日前まで	10回以内 (無人ヘリ散布は 3回以内)		
	疫病					8	3.2
らっかせい	そうか病 褐斑病	400~600	100~300	収穫14日前まで	3回以内		
いんげんまめ	炭疽病	600	100~300	収穫30日前まで	4回以内		
そらまめ 未成熟そらまめ	さび病 輪紋病	400~600			3回以内		
	あずき				茎疫病 さび病	400	
だいず	べと病 紫斑病	400			収穫45日前まで	3回以内	
		400~600					
てんさい	褐斑病	125	25	収穫21日前まで	5回以内		
		8	1.6				
やまのいも	葉渋病 炭疽病	400~600	100~300	収穫21日前まで	4回以内		
にんにく	葉枯病	400~500					
		白斑葉枯病	400				
いちご	じゃのめ病 炭疽病	600	仮植栽培期 但し収穫76日 前まで	6回以内			
トルコギキョウ	炭疽病	400	100~300	発病初期	8回以内		
ばら きく カーネーション	黒星病 さび病 べと病 炭疽病 灰色かび病	400~600	—				
	班入りアマドコロ					褐色斑点病 斑点病	400
シクラメン	炭疽病	500	1回				
ベンジャミン	斑点細菌病	400	200~700	8回以内			
すぎ	赤枯病	400~600	2回以内				