

ポリバリン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	イミノクタジン を含む農薬 の総使用回数	ポリオキシンを含む 農薬の総使用回数			
りんご	斑点落葉病 すす点病 すす斑病	1500～2000	200～700	収穫3日前まで	3回以内	散布	8回以内 (液剤及び水和剤 は合計6回以内(開 花期以降は 3回以内)、 塗布剤は2回以 内)	5回以内 (散布は3回以内)			
	うどんこ病 黒星病 褐斑病	1500									
みかん	灰色かび病	750～1500		開花期～幼果期					3回以内	5回以内	
	そうか病	750～1000									
たんかん	灰色かび病	750～1500		収穫21日前まで	2回以内				2回以内	2回以内	
	そうか病 赤衣病	750～1000									
かんきつ (みかん、たんかん を除く)	灰色かび病	750～1500									
	そうか病	750～1000									
なし	黒斑病	1500～2000		収穫14日前まで	3回以内				5回以内 (塗布剤は 2回以内、 液剤は1回以内)	5回以内 (イミノクタジン酢酸塩・ ポリオキシン水和剤は 3回以内)	
	うどんこ病 輪紋病 黒星病	1500									
ぶどう	灰色かび病	750～1500		収穫60日前まで	2回以内				3回以内 (休眠期は 1回以内、 生育期は 2回以内)	5回以内	
	黒とう病 晩腐病 褐斑病	750～1000									
	うどんこ病	750～2000									
うめ	灰色かび病 すす斑病 黒星病	1000		収穫30日前まで	3回以内				3回以内	3回以内	
かき	うどんこ病 灰色かび病 炭そ病	1000～2000									
きゅうり	灰色かび病 褐斑病 ハダニ類 アザミウマ類	1000	100～300	収穫前日まで	2回以内	散布	7回以内	2回以内			
	すいか	うどんこ病							1000～2000	4回以内	5回以内
つる枯病 炭疽病 ハダニ類		1000									
メロン	うどんこ病	1500～2000			5回以内					5回以内	5回以内 (塗布は1回以内)
	つる枯病 ハダニ類	1500									
なす	アザミウマ類	1000			収穫7日前まで			3回以内		4回以内	3回以内
	灰色かび病 ハダニ類										
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病	1000～2000			収穫7日前まで			4回以内		3回以内	
なす	灰色かび病 うどんこ病 褐色斑点病 ハダニ類 アザミウマ類	1000			収穫前日まで			3回以内		3回以内	3回以内
ねぎ	黒斑病 小菌核腐敗病 黄斑病 葉枯病 ネギアザミウマ	1500			収穫14日前まで			5回以内		5回以内	5回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病	750～1000			収穫3日前まで			3回以内		3回以内	3回以内
にんにく	葉枯病 黄斑病	1000～1500			収穫14日前まで			5回以内		5回以内 (種子粉衣は 1回以内、 無人ヘリ散布は2 回以内)	5回以内
にんじん	黒葉枯病 斑点病	1500～2000			発病初期			8回以内		8回以内	8回以内
花き類・観葉植物 (ストック、スターチス、 チューリップ、 ばら、きく、クルクマ を除く)	灰色かび病	1000									
ストック	菌核病 灰色かび病										
スターチス	うどんこ病 灰色かび病										
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病										
クルクマ	さび斑病 灰色かび病										
きく	灰色かび病 白さび病										
ばら	灰色かび病										
	うどんこ病										
樹木類 (かし、まさき、 さるすべりを除く)	うどんこ病 灰色かび病		200～700	3回以内			3回以内				
かし	紫かび病										
まさき さるすべり	うどんこ病	1000～2000			5回以内				5回以内	5回以内	
	灰色かび病	1000									