

リゾレックス水和剤								
作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリクロホスメチルを含む農薬の総使用回数	
りんご	紫紋羽病	1000倍	40L/樹	収穫60日前まで	1回	土壌灌注	1回	
麦類	雪腐小粒菌核病	1000～1500倍	60～150L/10a	根雪前	2回以内	散布	2回以内	
てんさい	根腐病	100倍	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m <sup>2</sup> )	定植前	1回	灌注	6回以内 (育苗土壌への混和は1回以内、500倍希釈灌注は1回以内、100倍希釈灌注は1回以内 散布は3回以内)	
	葉腐病	500～1000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布		
	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	500倍	3L/m <sup>2</sup>	育苗中期	1回	土壌灌注		
ばれいしょ	黒あざ病	50～100倍	—	貯蔵前又は植付け前		種いも浸漬 (10分以内)	1回	
にんじん	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	は種時	3回以内	全面土壌灌注	2回以内(は種前は1回以内、は種後は1回以内)	
	根腐病	500倍	300L/10a	収穫14日前まで		散布		
レタス	すそ枯病 白絹病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
キャベツ	株腐病	500～1000倍						
トマト きゅうり なす ほうれんそう	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	500倍	3L/m <sup>2</sup>	は種時	1回	土壌灌注	1回	
ピーマン		種子重量の0.5%粉衣	—			種子重量の0.5%粉衣		種子粉衣
		500倍	3L/m <sup>2</sup>					土壌灌注
ししとう 甘長とうがらし ぎぼうし		白絹病	1000倍			1L/m <sup>2</sup>		収穫前日まで
				収穫90日前まで				
アスパラガス	茎枯病	500倍	100～300L/10a	収穫後から茎葉刈取り期まで但し、収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	苗立枯病			株養成期(は種又は定植時から茎葉刈取り期まで)但し、収穫14日前まで				
メロン	黒点根腐病	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	定植時	1回	株元灌注	2回以内 (定植時は1回以内、生育期は1回以内)	
こんにやく だいず	白絹病			生育期 但し、収穫21日前まで				
ふき				白絹病	収穫30日前まで	3回以内	土壌灌注	3回以内
	収穫14日前まで							
にら にら(花茎)	白絹病	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	収穫21日前まで	1回	株元灌注	3回以内回以内(種茎粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内)	
ねぎ	茎腐病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	株元散布	2回以内	
うど				土寄せ時但し、収穫14日前まで	3回以内			
はすいも(葉柄)				収穫7日前まで	3回以内			
メキャベツ	立枯症 (リゾクトニア菌)	500倍	3L/m <sup>2</sup>	は種、仮植時及び定植時	3回以内	土壌灌注	3回以内	
みぶな	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000倍	1L/m <sup>2</sup> 150ml/穴	は種時及び子葉展開時	1回	2回以内	1回	
オクラ					2回以内		植穴土壌灌注	2回以内
ブロッコリー		500倍	3L/m <sup>2</sup>	育苗期	2回以内	土壌灌注	3回以内 (育苗期は2回以内、定植後は1回以内)	
豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめを除く)		1000倍	1L/m <sup>2</sup>	は種時	1回	株元灌注		
さやえんどう 実えんどう	茎腐病	種子重量の0.5%粉衣	—	は種時	1回	種子粉衣	3回以内 (種子粉衣は合計1回以内、は種時の土壌灌注は合計1回以内生育期の土壌灌注は2回以内(但し、は種時に土壌灌注する場合には1回以内))	
未成熟そらまめ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000倍	1L/m <sup>2</sup>	は種時	2回以内	土壌灌注	2回以内 (は種時は1回以内)	
	茎腐病					収穫前日まで		株元灌注
未成熟とうもろこし	紋枯病	1500倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
みょうが(花穂)	白絹病	2000倍	5L/m <sup>2</sup>	みょうが(花穂)の収穫14日前まで、但し花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで		土壌灌注		
みょうが(茎葉)						土壌灌注		
ふだんそう	立枯病	500倍	3L/m <sup>2</sup>	は種時但し収穫30日前まで	1回	株元灌注	1回	
みつば			0.5L/m <sup>2</sup>	収穫90日前まで	2回以内		2回以内(は種前の土壌混和は1回以内)	
みつば(水耕栽培)		1000倍	100～300L/10a	育苗期但し収穫40日前まで	1回		1回	
みずな		リゾクトニア病	500～1000倍	3L/m <sup>2</sup>	は種時		5回以内	土壌灌注
花き類・観葉植物	立枯病 株腐病 茎腐病	生育期			株元灌注			
スイトピー	白絹病	500～1000倍	3L/m <sup>2</sup>	—	5回以内	株元灌注	5回以内	
カーネーション	根腐病 苗立枯病 (リゾクトニア菌)	500～1000倍	3L/m <sup>2</sup>	生育期	5回以内	土壌灌注		
アスター	苗立枯病 (リゾクトニア菌)							
チューリップ	葉腐病	100倍	100L/10a	植付前	1回	全面散布土壌混和	5回以内	
		200倍	200L/10a	植付後～萌芽前		全面土壌散布		
ハイドラングア	葉腐病	500～1000倍	100～300L/10a	生育期	5回以内	散布	5回以内	
えぞまつ(苗木) とどまつ(苗木)	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	発芽後(発病初期)		苗木兼全面土壌散布		
樹木類	くもの巢病		200～700L/10a	発病初期		散布		
	白絹病	3L/m <sup>2</sup>	株元灌注					