

ザンプロ DM フロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アトクトラジンを含む農薬の総使用回数	ジメトモルフを含む農薬の総使用回数
小粒種ぶどう	べと病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	3回以内	2回以内
大粒種ぶどう				収穫30日前まで				
だいず	べと病	1500～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		
		8～16倍	0.8～1.6L/10a			散布		
	茎疫病	1000～1500倍	100～300L/10a			無人航空機による散布		
		8～12倍	0.8～1.2L/10a			散布		
あずき	茎疫病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで		無人航空機による散布		
		8倍	0.8L/10a			散布		
		16倍	1.6L/10a			無人航空機による散布		
ばれいしょ	疫病	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫前日まで		3回以内		
		250倍	25L/10a				無人航空機による散布	
		8倍	0.8L/10a					
		16倍	1.6L/10a					
		32倍	3.2L/10a					
トマト ミニトマト		1500倍						
きゅうり	べと病	1500～2000倍	100～300L/10	収穫7日前まで	3回以内		散布	
たまねぎ	白色疫病 べと病						8倍	0.8L/10a
		16～24倍	1.6L/10a					
ねぎ	べと病	1500～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで			散布	
		8倍	0.8L/10a			無人航空機による散布		
		16～24倍	1.6L/10a					
レタス はくさい		1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで			散布	
たばこ	疫病	1000～1500倍	100～180L/10a	収穫10日前まで		2回以内		2回以内