

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	使用方法	本剤及びピピメクチンを含む農薬の総使用回数
みかん	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～4000倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	散布	4回以内
	ミカンハモグリガ	1000～2000倍				
	ミカンサビダニ	2000～4000倍				
	チャノホコリダニ	4000倍				
かんきつ (みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～4000倍				
	ミカンハモグリガ	1000～2000倍				
	ミカンサビダニ	2000～4000倍				
	チャノホコリダニ	4000倍				
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ	2000～3000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	
さといも		2000倍				
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000～3000倍				
豆類(未成熟、ただし、 えだまめ、さやえんどう を除く)	ハスモンヨトウ	2000倍				
さやえんどう	ハモグリバエ類	1000倍				
メロン	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍				
すいか	オオタバコガ	1000倍				
アスパラガス	コナジラミ類					
いちご	ハスモンヨトウ	2000倍				
	オオタバコガ	1000～2000倍				
トマト ミニトマト	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 トマトサビダニ	2000倍				
	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍				
なす	ハスモンヨトウ コナジラミ類					
	オオタバコガ ハモグリバエ類 チャノホコリダニ	2000倍				
ピーマン とうがらし類	コナジラミ類	1000～2000倍				
	ハスモンヨトウ オオタバコガ チャノホコリダニ	2000倍				
きゅうり	コナジラミ類	1000倍				
		2000倍				
ほうれんそう セルリー	ハスモンヨトウ					
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ					
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ ハスモンヨトウ キスジノミハムシ ハモグリバエ類	1000～2000倍				
非結球レタス	オオタバコガ					
レタス	ハスモンヨトウ					
キャベツ	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ ウワバ類					
	シロイチモジヨトウ	2000倍				
はくさい	キスジノミハムシ	1000倍				
	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ カブラハバチ	1000～2000倍				
ブロッコリー	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ					
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍				
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ	1000～2000倍				
	ネギアザミウマ ハモグリバエ類	1000倍				
たまねぎ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000倍				
だいこん	コナガ、アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	1000～2000倍				
かぶ	コナガ	1000倍				
	キスジノミハムシ	2000倍				
未成熟とうもろこし	オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	1000倍				
	ハスモンヨトウ	2000倍				
ヤングコーン	オオタバコガ	1000倍				
食用金魚草 食用なでしこ 食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー しそ科葉菜類(しそを 除く) しそ(花穂)	ハスモンヨトウ	2000倍				
しそ	ハスモンヨトウ シソサビダニ					
食用ぎく	オオタバコガ					
きく(葉)	ハスモンヨトウ					
茶	チャノコカクモンハマキ	1000～2000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	2回以内	
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ		100～ 300L/10a	発生初期	6回以内	
	マメハモグリバエ	1000倍				
カーネーション	オオタバコガ	1000～2000倍				
ストック	コナガ					
りんどう	リンドウホソハマキ	2000倍				