

エバーゴールド箱粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	
稲(箱育苗)	疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色色菌核病菌) もみ枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当たり50g	移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に散布する	
	穂枯れ(ごま葉枯病菌) 白葉枯病 内穎褐変病		は種時(覆土前) ～移植当日			
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ フタオビコヤガ いもち病 紋枯病		は種時(覆土前) ～移植当日			
	穂枯れ(ごま葉枯病菌) 白葉枯病 内穎褐変病	高密度には種する 場合は1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当たり 50～100g)	は種前			育苗箱の床土又は覆土に 均一に混和する
	疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色色菌核病菌) もみ枯細菌病		移植3日前～移植 当日			育苗箱の上から 均一に散布する
			移植当日			